

## STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

**PÉČE O VYBRANÉ  
TERESTRICKÉ BIOTOPY**

**KOSENÍ**

**SPPK D02 004:2015**

**ŘADA D**

Anglický název: Mowing of grasslands

Německý název: Grünland mähen

Tento standard obsahuje definice technických a technologických postupů při péči o travní porosty a rákosiny kosením.

### Související zdroje:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, oboje ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

### Zpracování standardu:

Pro AOPK ČR zpracovala v r. 2014 – 2015 Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

### Oponentské pracoviště:

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

### Autorský kolektiv:

doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D., Mgr. Andrea Svobodová, prof. RNDr. František Krahulec CSc.

### Ilustrace:

Mgr. Andrea Svobodová

Dokumentace ke zpracování standardu je dostupná v knihovně AOPK ČR.

Standard schválen .....

RNDr. František Pelc  
Ředitel AOPK ČR

**Obsah**

<b>1. Účel a náplň standardu .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Mechanizace používaná při kosení .....</b>	<b>4</b>
2.1 Ručně nesená nebo vedená mechanizace .....	4
2.2 Pojízdná mechanizace .....	4
2.3 Rozdělení žacích strojů podle pohybu ostří do řezu .....	5
<b>3. Postup při kosení .....</b>	<b>6</b>
3.1 Zásady správného kosení a sklizně travní hmoty .....	6
3.2 Frekvence kosení .....	7
3.3 Typy seče .....	7
<b>4. Nakládání s travní hmotou .....</b>	<b>9</b>
4.1 Využití travní hmoty .....	9
4.2 Shrnování a úklid travní hmoty .....	9
4.3 Likvidace travní hmoty .....	10
<b>Příloha č. 1 Ilustrace .....</b>	<b>11</b>
<b>Příloha č. 2 Seznam zpracovávaných Standardů péče o přírodu a krajinu (Péče o vybrané terestrické bioty) .....</b>	<b>15</b>

## 1. Účel a náplň standardu

---

Standard „Kosení“ definuje mechanizační prostředky a techniku zásahů realizovaných na travních společenstvech a rákosinách za účelem jejich obnovy či zachování přírodě blízkých ekosystémů, stanovišť pro rostliny i živočichy a zachování či zvýšení jejich druhové diverzity.

Standard je určen především žadatelům o podporu z krajinotvorných dotačních programů, dále dodavatelům, pracovníkům státní správy a samosprávy, nevládním organizacím, zemědělcům, vlastníkům a uživatelům pozemků. Týká se sklizně travních porostů a rákosin ve zvláště chráněných územích a na cenných biotopech. Nezabývá se primárně produkcí píče zaměřenou na živočišnou produkci.

Trvalé travní porosty na našem území představují většinou sekundární, polopřirozené biotopy, vzniklé činností člověka. Jejich existence je tedy závislá na lidské péči. V případě, že o travní porosty není pečováno (kosením nebo pastvou), dochází nejdříve ke změně druhového složení porostu a později k postupnému zarůstání dřevinami. Kosení travních porostů je důležité nejen pro zachování či zlepšení jejich botanické skladby, ale také pro zachování charakteru krajiny. Způsob seče a termín seče ovlivňuje nejen diverzitu rostlin, ale také živočichy žijící v travních porostech (bezobratlé i obratlovce).

### Právní rámec

**Zákon č. 114/1992 Sb.**, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – mimo jiné vymezuje základní pojmy, včetně např. významného krajinného prvku, definuje základní povinnosti při obecné ochraně přírody - obecné ochraně rostlin a živočichů a ochraně volně žijících ptáků. Dále upravuje ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a zvláště chráněných území. V neposlední řadě též reguluje ochranu evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

**Zákon č. 185/2001 Sb.**, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – mimo jiné definuje, kdy se věc, včetně např. travní hmoty, stává odpadem a dále upravuje problematiku likvidace a zpracování biologicky rozložitelných odpadů (tzv. bioodpady), kam spadá dle **vyhlášky č. 341/2008 Sb.**, o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady i travní hmota v případě, že není využita jako krmivo pro dobytek.

**Zákon č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů - mimo jiné upravuje podmínky pro ochranu povrchových a podzemních vod a to tak, že při kompostování a skládkování travní hmoty nesmí dojít k ohrožení životního prostředí a ohrožení kvality těchto vod.

**Zákon č. 89/2012 Sb.**, občanský zákoník - upravuje nakládání s travní hmotou ve smyslu toho, že vlastníku věci se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob. Dále se vlastník musí zdržet všeho, co působí, že např. kouř (druh imise) v míře nepřiměřené místním poměrům podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku jiného vlastníka.

## 2. Mechanizace používaná při kosení

---

### 2.1 Ručně nesená nebo vedená mechanizace

#### 2.1.1 Kosa

2.1.1.1 Používá se při kosení malých, špatně přístupných anebo podmáčených ploch či ploch s výskytem významných druhů bezobratlých živočichů či dvouděložných rostlin.

2.1.1.2 Použití kosa je vhodné na lokalitách s relativně rovňším povrchem půdy a bez vyššího podílu náletových dřevin.

#### 2.1.2 Motorový křovinořez

2.1.2.1 Dle sekacího/řezacího ústrojí:

- Křovinořez s kotoučem
- Křovinořez se strunou

2.1.2.2 Používá se na svažítých, silně podmáčených plochách, či plochách s členitým mikroreliefem.

2.1.2.3 Na lokalitách s vyšším podílem dvouděložných rostlin bude kosení provedeno křovinořezem s kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).

#### 2.1.3 Jednonápravová ručně vedená sekačka

2.1.3.1 Dle sekacího/řezacího ústrojí:

- Sekačka s rotačním žacím ústrojím
- Sekačka s prstovým žacím ústrojím

2.1.3.2 Používá se při kosení větších ploch s relativně rovňším povrchem půdy bez výraznějšího podmáčení.

2.1.3.3 Na lokalitách s vyšším podílem dvouděložných rostlin bude kosení provedeno sekačkou s prstovým žacím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).

### 2.2 Pojízdňá mechanizace

#### 2.2.1 Kosení lehkou (malovýrobní) mechanizací

2.2.1.1 Traktorové sekačky s celkovou hmotností soupravy do 3 500 kg s nízkotlakými pneumatikami a vhodným žacím ústrojím (viz bod 2.3)

2.2.1.2 Samojízdňé sekačky s celkovou hmotností soupravy do 3 500 kg s nízkotlakými pneumatikami a vhodným žacím ústrojím (viz bod 2.3)

2.2.1.3 Lehká mechanizace se používá při kosení svažítých ploch, menších a členitých pozemků, které jsou pro tuto mechanizaci dostupné.

#### 2.2.2 Kosení těžkou (velkovýrobní) mechanizací

2.2.2.1 Kosení probíhá s použitím sekaček s celkovou hmotností soupravy od 3 500 kg.

- 2.2.2.2 Kosení travních porostů s použitím velkovýrobní mechanizace je možné na velkých, pravidelných a rovinných pozemcích (použití je omezeno svahovou dostupností do 12°).

### 2.3 Rozdělení žacích strojů podle pohybu ostří do řezu

#### 2.3.1 Lištové prstové a lištové s protiběžným ostřím – bezprsté

- 2.3.1.1 Pohyb ostří je přímočarý vratný, řez hladký bez roztřepení.
- 2.3.1.2 Výhodou je hladký řez bez roztřepení (zejména u dvouděložných rostlin) a pomalejší pohyb strojů po pozemku umožňující únik živočichů. Jsou proto vhodné na lokality s vyšším podílem dvouděložných rostlin (umožňují lepší obrůstání) a celkově s vyšší biodiverzitou.
- 2.3.1.3 Jejich nevýhodou je menší plošný výkon (používat na menších plochách), nespolehlivost při kosení vlhkých a polehlých porostů a vyšší nároky na údržbu (broušení a výměna nožů).

#### 2.3.2 Bubnové, diskové a mulčovače

- 2.3.2.1 Pohyb ostří je rotační, kvalita řezu je nižší (zejména po otupení nožů) než u typu mechanizace v bodě 2.3.1. Rány jsou větší a často roztřepené.
- 2.3.2.2 Nižší kvalita řezu vede k pomalému obrůstání, oslabení rostlin (musí vynaložit více zásobních látek na vytvoření kalusu), zvyšuje se riziko napadení houbovými patogeny.
- 2.3.2.3 Dochází ke snižování produkce travní hmoty a ke změně botanického složení (dvouděložné druhy jsou citlivější než trávy).
- 2.3.2.4 Mechanizaci s rotačním pohybem ostří není vhodné používat na botanicky cenných lokalitách.
- 2.3.2.5 Použití mulčovače je upraveno v bodě 4.3.2.

### 3. Postup při kosení

---

#### 3.1 Zásady správného kosení a sklizně travní hmoty

- 3.1.1 Volba mechanizace bude přizpůsobena daným povětrnostním podmínkám a vlhkosti půdy na konkrétní lokalitě, tak aby nedošlo k nadměrnému poškození travního drnu.
- 3.1.2 Při kosení a sklizni travních porostů dochází za vlhkosti půdy blízké polní kapacitě k devastaci drnové vrstvy (vyježděné koleje, zhutnění půdy, strhnutí drnu, překrytí porostu rozježděnou zeminou).
- Možnosti zamezení poškození travního drnu:
- Posun termínu prací do doby, kdy se riziko devastace půdy sníží (půda vyschne)
  - Využití mechanizace, která je vybavena širokými či nízkotlakými pneumatikami s vyšší únosností
  - Použití ručně vedené mechanizace či ručního nářadí s nízkou hmotností (viz bod 2.1).
- 3.1.3 V případě nepřístupných ploch nebo dlouhodobě deštivého počasí bude zvolen z nabídky různých způsobů vhodný typ kosení a stahování travní hmoty.
- 3.1.4 Při výběru mechanizace, způsobu seče a úklidu travní hmoty budou brány v úvahu všechny potřebné aspekty – předmět ochrany (biotop, rostlinný či živočišný druh) a jeho potřeby pro obnovu, zachování či zlepšení, dostupnost, svažitost a další podmínky lokality.
- 3.1.5 Těžká mechanizace (viz bod 2.2.2) nesmí být použita za vyšší vlhkosti, kdy hrozí riziko poškození povrchu půdy – drnu (vyježděné koleje, zhutnění půdy, obtížná sklizeň v následujících termínech).
- 3.1.6 Vysoké výkony při kosení těžkou mechanizací snižují možnost úniku živočichů ze sečených porostů. U pozemků, kde je to umožněno jejich výměrou a tvarem, bude kosení probíhat od jednoho okraje pozemku k druhému (viz Obr. 4) nebo od středu ke krajům (viz Obr. 5). Důvodem je ponechání možnosti úniku zvěře a dalších živočichů, kteří jsou takto vytlačováni k okrajům, kudy mohou uniknout
- 3.1.7 Používá se mechanizace s vhodným žacím ústrojím (viz bod 2.3).
- 3.1.8 Na zamokřených pozemcích neumožňuje snížená únosnost povrchu půdy použití standardních mechanizačních prostředků a posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklizena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými pneumatikami.
- 3.1.9 Na svazích o sklonu nad 12° je nutno použít speciální mechanizaci se sníženým těžištěm (riziko převrácení) nebo biomasu sklízet ručně.

## 3.1.10 Výška kosení:

- Optimální výška kosení travních porostů je 6 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškozování drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavádání píce, kontaminaci zeminou a k poškozování žacích strojů kameny)
- Travní porosty budou dosahovat před kosením výšky alespoň 15 cm

**3.2 Frekvence kosení**

3.2.1 Počet kosení během vegetační sezóny závisí na ekologických podmínkách na konkrétní lokalitě, zejména s ohledem na dostupnost vláhy, obsah živin v půdě a na nadmořskou výšku.

3.2.1.1 Travní porosty lze rozdělit na:

- Občasné sečené - jednou za dva až tři roky – ve specifických podmínkách (např. při výrazném suchu, oligotrofní společenstva) je možno seč v některých letech vynechat bez výrazného vlivu na druhové složení porostů.
- Jednosečné - horské jednosečné louky, oligotrofní a xerotermní luční společenstva, popřípadě u ostatních společenstev při extrémním průběhu počasí (zejména výrazné sucho).
- Dvousečné – travní porosty na živinami bohatých půdách (ve vlhkých letech mohou být i trojsečné).
- Vícesečné – porosty nebo jejich části s přítomností invazních/expanzních druhů rostlin, které je třeba likvidovat.

**3.3 Typy seče**3.3.1 **Seč plošná**

3.3.1.1 Travní porost je posečen v jednu chvíli na celém pozemku plošně.

3.3.1.2 Musí být dodrženy podmínky postupu kosení v rámci pozemku (viz bod 3.3.5).

3.3.2 **Ponechání nekosených ploch**

3.3.2.1 Při kosení bude v porostu ponechána nepokosená plocha nebo několik ploch.

3.3.2.2 Tvar, velikost, počet a umístění nepokosených ploch/y bude zakresleno do leteckého snímku lokality (příloha smlouvy), případně označeno v terénu viditelně umístěnými kolíky.

3.3.2.3 Parametry nepokosené plochy budou stanoveny v závislosti na druhu/druzích, které mají být opatřením podpořeny. Rovněž bude stanoveno, zda bude ponechaná plocha pokosena v roce provedení seče nebo až v roce následujícím.

3.3.2.4 Velikost nepokosené plochy:

- Drobné izolované enklávy do 1 ha - nejméně 20% celkové plochy, pokud

je lokalita zachovalá a vegetačně stabilní

- Lokality od 1 – do 5 ha - nejméně 15 % celkové plochy
- Lokality nad 5 ha - nejméně 10 % celkové plochy

3.3.2.5 Jednotlivé nepokosené plochy je nutné mezi jednotlivými roky střídat tak, aby nepokosené části nezůstávaly déle než 1 rok a nedocházelo k hromadění stařiny, případně šíření náletových dřevin.

3.3.2.6 Nepokosené plochy nebudou ponechávány v částech porostu, které obsahují nežádoucí expanzní či invazní druhy rostlin:

třtina křovištní (*Calamagrostis epigejos*), bolševník velkolepý (*Heracleum mantegazzianum*), vlčí bob mnoholistý (*Lupinus polyphyllus*), šťovík alpský (*Rumex alpinus*), šťovík tupolistý (*Rumex obtusifolius*), šťovík kadeřavý (*Rumex crispus*), šťovík dlouholistý (*Rumex longifolius*).

### 3.3.3 Seč mozaiková

3.3.3.1 Bude uplatňována na lokalitách sečených ručně kosou či křovinořezem nebo s použitím ručně vedené sekačky, zejména na druhově bohatých, dobře zachovalých a členitých plochách s vysokou diverzitou bezobratlých živočichů.

3.3.3.2 Není nutná při asanačních zásazích a kosení ruderalizovaných či degradovaných ploch.

3.3.3.3 Podíly nepokosených částí budou obdobné jako nepokosených ploch (viz bod 3.3.2.4).

3.3.3.4 Při kosení budou vynechávány menší plochy na vegetačně stabilních místech, plochy květnaté, bez výskytu invazních či jinak nežádoucích druhů.

3.3.3.5 Velikost mozaiky závisí na heterogenitě prostředí:

- Na plochách s homogenní vegetací (pokud nejsou koseny pásově) budou ponechány nepokosené plochy v řádech desítek m<sup>2</sup>.
- Na plochách členitých a vegetačně pestrých je třeba mozaiku zmenšit a vynechávat plochy v řádech několika m<sup>2</sup> (ne menší než 4 x 4 m, jinak dochází k vysychání ploch, nedokončení vývoje housenek).

3.3.3.6 Mozaiková seč bude v následujících letech prováděna tak, aby se prostorově neopakovala místa kosená dříve či později.

### 3.3.4 Seč fázovaná

3.3.4.1 Travní porost bude posečen postupně, po částech v různém časovém rozmezí. Počet částí a termíny seče budou určeny ve smlouvě o dílo/dohodě přílohou bude letecký snímek lokality se zákresem nepošečených částí.

3.3.4.2 Fázová seč se používá na pozemcích s větší výměrou a při použití pojízdné mechanizace.

3.3.4.3 Fázová seč bude v následujících letech prováděna tak, aby se prostorově neopakovala místa kosená dříve či později.



## 4. Nakládání s travní hmotou

---

### 4.1 Využití travní hmoty

#### 4.1.1 Sušení travní hmoty na seno

- 4.1.1.1 Při tradiční sklizni pro krmení hospodářských zvířat zůstává posečená píce jeden až několik dnů na pozemku pro snížení obsahu vody z původních 75 až 85 % na 40 až 15 %.
- 4.1.1.2 Během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávání semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy.
- 4.1.1.3 V případě, že porost obsahuje expanzní nebo invazní druhy rostlin, je třeba posunout termín sklizně do období před jejich kvetením, tak aby nedocházelo k tvorbě zralých semen (invazní rostliny viz standard SPPKD 02 007:2015 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin).

#### 4.1.2 Využití zelené travní hmoty

- 4.1.2.1 Biomasa bude po pokosení odstraněna bez sušení (např. pro siláž ze zavadlé píce).
- 4.1.2.2 Pokosenou hmotu je vhodné ponechat alespoň jeden den na ploše. Bude tak umožněn únik bezobratlých předtím než dojde ke sběru hmoty.
- 4.1.3 Doba ponechání píce na lokalitě nesmí přesáhnout 1 týden, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin.

### 4.2 Shrnování a úklid travní hmoty

#### 4.2.1 Hrabání travní hmoty

- 4.2.1.1 Na lokalitách, kde není možné použití mechanizace (svažité, kamenité, podmáčené) a dále na lokalitách s výskytem významných druhů bezobratlých (zejména mravenců žijících v nadzemních hnízdech) bude travní hmota shrabána pomocí hrábí.
- 4.2.1.2 Na rozměrnějších plochách a tam, kde je vhodné podpořit narušení drnu a potlačit mechové patro, např. lokality s výskytem druhů hořečků bude použita mechanizace (menší plochy citlivé na zhutnění půdy obhospodařovat pomocí obraceče a shrnovače k ručně vedené sekačce, na ostatní lze použít obraceč a shrnovač za traktor). Tento způsob je efektivnější a dochází k odstranění vrstvy mechů a stařiny.

#### 4.2.2 Sběr travní hmoty

- 4.2.2.1 Na lokalitách, kde není možné použití mechanizace (svažité, kamenité, podmáčené), případně jsou na citlivé na zatížení, bude travní hmota sebrána ručně pomocí vidlí.
- 4.2.2.2 Na ostatních plochách lze použít sběr mechanizací (sběrač za traktor (lis, sběrací vůz)
- 4.2.2.3 Travní hmota bude podle konkrétní lokality nakládána na vůz či plachtu (uplatnění na svažitých, podmáčených či jinak nepřístupných pozemcích).

#### 4.2.3 Stahování/svážení travní hmoty

- 4.2.3.1 Trasa stahování/svážení bude určena na základě podmínek na konkrétní lokalitě (stále po stejné trase nebo po různých trasách, aby nedošlo k soustředěnému poškození drnu).

### 4.3 Likvidace travní hmoty


- 4.3.1 V případě, že není možné využít travní hmotu jako krmivo pro zvířata (seno, zelená píče), je nutno přistoupit k alternativnímu využití či likvidaci travní hmoty:
1. kompostování
  2. bioplynové stanice
  3. skládkování
  4. spalovny
- 4.3.1.1 Nakládání s pokosenou travní hmotou, která není určena ke zkrmování, energetickým účelům či kompostování se musí řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími vyhláškami (zejména vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).
- 4.3.1.2 Sklizená hmota nesmí být pálena na místě sklizně.
- 4.3.1.3 Kompostování je možné na lokalitách, které jsou živinami chudé a kde je nutno je vracet zpět (jedná se o ochuzované mesotrofní porosty). Kompost bude založen na předem určené ploše v rámci kosené lokality (místa bez cenné vegetace). V případě, že kompost není možno založit na kosené ploše, lze jej založit na sousedním pozemku (se souhlasem majitele pozemku).
- 4.3.2 **Mulčování**
- 4.3.2.1 Mulčování oddělí nadzemní biomasu od strniště a současně ji rozmělní a rozptýlí po povrchu pozemku. Biomasa se nesbírá a ponechává se na místě k rozložení.
- 4.3.2.2 Tato technologie může být použita pouze v ojedinělých, výjimečných případech pro první odstranění travní hmoty na opuštěném travním porostu s dřevinnou vegetací v počátečních fázích sukcese, jako obnovný způsob péče a dále pro likvidaci nedopasků na pastvinách, které jsou tvořeny nechutnými druhy. **Zásah bude jednorázový a již se neopakující.**
- 4.3.2.3 Mulčování přestárých, vysokých porostů vede k akumulaci vyšší vrstvy těžce rozložitelné travní hmoty, která se do zimy v důsledku nízkých teplot a vysokého poměru C/N nestihne rozložit. Na jaře pak brání vzcházení semenáčků, ztěžuje obrůstání rostlin a kontaminuje píci plísněmi.
- 4.3.2.4 Mulčování, decimuje populace hmyzu, zejména nelétavých vývojových stádií. Na ochránářsky cenných lokalitách by mělo být mulčování využíváno zcela výjimečně nebo vůbec.

## Příloha č. 1 Ilustrace




Obr. 1 Seč s ponecháním neposečených pásů (viz kapitola 3.3.2)







Obr. 2 Seč s ponecháním mozaiky (viz bod 3.3.3.5)



Obr. 3 Seč s ponecháním drobné mozaiky (viz bod 3.3.3.5)



Obr. 4 Kosení od jednoho okraje pozemku k druhému (viz bod 3.1.6)



Obr. 5 Kosení od středu pozemku k okrajům (viz bod 3.1.6)

**Příloha č. 2 Seznam zpracovávaných Standardů péče o přírodu a krajinu  
(Péče o vybrané terestrické biotopy)****00 Obecné**

00 001 Názvosloví

**01 Kontroly, hodnocení, plánování****02 Technologické postupy**

02 001 Obnova travních společenstev s využitím regionálních směsí

02 002 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin)

02 003 Pastva

02 004 Kosení

02 005 Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porostů

02 006 Disturbanční management na nelesních plochách

02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin

02 008 Likvidace vybraných invazních druhů živočichů

**03 Bezpečnost při práci a ochrana zdraví**

© 2015 Mendelova univerzita v Brně  
Agronomická fakulta  
Zemědělská 1  
613 00 Brno

© 2015 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11

SPPK D02 004  
[www.standardy.nature.cz](http://www.standardy.nature.cz)

2015

- 16 -